

ONE-MINUTE-WONDER

Eine Minute Wissen-Kompakt

Standardhygienemaßnahmen:

- Hygienische Händedesinfektion: Konsequente Umsetzung der KRINKO-Empfehlungen.
 - o Auf Stationen mit Patienten der RG 2 und 3 wird für das Personal Bereichskleidung empfohlen. Geeignete Schutzkleidung soll ausschließlich patientenbezogen (generell bei Pflege von Patienten mit Diarrhoe oder großen Wunden) getragen werden. Bei Patienten der Risikogruppe 3, die protektiv isoliert werden, ist der Einsatz keimarmer, patientenbezogener Schutzkittel für Personal und Besucher zu empfehlen.
- MNS (außerhalb der protektiv isolierten RG 3, hier Pflicht) nur gezielt zur Prävention von Tröpfcheninfektionen

Unterbringung:

- Granulozytopenische Patienten der Risikogruppe 1 und 2 können unter strikter Einhaltung der Standardhygienemaßnahmen in einem Zweibett-Zimmer mit eigenem Sanitärbereich untergebracht werden.
- Patienten der Risikogruppe 3 müssen in einem Einzelzimmer mit eigenem Sanitärbereich isoliert werden.

Quelle(Hygienehandbuch)