



| Klinikum Wilhelmshaven | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|----------------|--------|-------|-------|-------|-------------------------|-------------------|
| Modul | Kennzahl | Qualitätsindikator (QI) | Referenzwert | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Statistisch unauffällig | Tendenz 2019-2020 |
| Gynäkologische Operationen | 10211 | Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund | ≤ 20,00 % | 13,33% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | ✓ | → |
| | 12874 | Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung | ≤ 5,00 % | 0,00 % | 2,63% | 0,00% | 0,00% | ✓ | → |
| | 51906 | Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation | ≤ 4,18 % | 0,00% | 2,54% | 1,24% | 0,00% | ✓ | ↗ |
| Mamma-Chirurgie | 2163 | Primäre Axilladisektion bei DCIS | Sentinel Event | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ✓ | → |
| | 52279 | Intraoperative Präparateradiografie oder -sonografie bei sonografischer Drahtmarkierung | ≥ 95,00 % | 91,67% | 100% | 100% | 100% | ✓ | → |
| | 52330 | Intraoperative Präparateradiografie oder -sonografie bei mammografischer Drahtmarkierung | ≥ 95,00 % | 100% | 100% | 100% | 100% | ✓ | → |